




Guía para el **tratamiento de la CLL/SLL** con VENCLEXTA

Representación de un actor

Solo los regímenes de VENCLEXTA están libres de quimioterapia y están diseñados para que:*

- Se completen en 14 meses en casos de CLL/SLL no tratados previamente con VENCLEXTA + acalabrutinib.
- Se completen en 12 meses en casos de CLL/SLL no tratados previamente con VENCLEXTA + GAZYVA® (obinutuzumab).
- Se completen en 24 meses† para CLL/SLL tratados previamente con VENCLEXTA + rituximab.

*Su proveedor de atención médica puede recetarle VENCLEXTA solo, que se toma hasta que su proveedor de atención médica le diga que deje de hacerlo.

†Desde el día 1 del ciclo 1 de rituximab, después de un aumento escalonado de la dosis de VENCLEXTA de 5 semanas.

¿Qué es VENCLEXTA?

VENCLEXTA es un medicamento de venta con receta para tratar a adultos con leucemia linfocítica crónica (CLL) o linfoma linfocítico de células pequeñas (SLL).

Se desconoce si VENCLEXTA es seguro y eficaz en niños.

Información importante de seguridad

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de VENCLEXTA?

VENCLEXTA puede provocar efectos secundarios graves, incluso:

Síndrome de lisis tumoral (TLS). El TLS se debe a la descomposición rápida de las células cancerosas. El TLS puede provocar insuficiencia renal, la necesidad de tratamiento con diálisis y puede ocasionar la muerte. Su proveedor de atención médica realizará análisis para controlar el riesgo de tener TLS antes de que comience a tomar VENCLEXTA. Recibirá otros medicamentos antes de comenzar el tratamiento con VENCLEXTA y durante este para ayudarlo a reducir el riesgo de TLS. Es posible que también reciba líquidos intravenosos (i.v.) en la vena. Su proveedor de atención médica realizará análisis de sangre para detectar si hay TLS cuando inicie por primera vez y durante el tratamiento con VENCLEXTA. Es importante que cumpla con sus citas para los análisis de sangre. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún síntoma de TLS durante el tratamiento con VENCLEXTA, incluso fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, confusión, falta de aliento, convulsiones, latidos cardíacos irregulares, orina oscura o turbia, cansancio inusual o dolor muscular o articular.

Beba abundante agua durante el tratamiento con VENCLEXTA para ayudar a reducir el riesgo de tener TLS.

Tome de 6 a 8 vasos (alrededor de 56 onzas en total) de agua por día, comenzando 2 días antes de su primera dosis y en el día de su primera dosis de VENCLEXTA, y cada vez que se aumente la dosis.

Su proveedor de atención médica puede demorar, disminuir su dosis o suspender el tratamiento con VENCLEXTA si usted tiene síntomas de TLS. Cuando se reinicie la administración de VENCLEXTA después de haberlo interrumpido 1 semana o más, su proveedor de atención médica puede volver a comprobar su riesgo de TLS y cambiar su dosis.

¿Quién no debe tomar VENCLEXTA?

Los pacientes que toman ciertos medicamentos durante el inicio de VENCLEXTA (cuando la dosis se aumenta lentamente) tienen un mayor riesgo de TLS.

- **Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que reciba**, incluidos medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. VENCLEXTA y otros medicamentos pueden interactuar entre sí y causar efectos secundarios graves.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas 22 y 23.

Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, en www.rxabbvie.com/pdf/venclaxta_spa.pdf.

Luche contra la CLL o el SLL con VENCLEXTA

Utilice esta guía para obtener información sobre:

- Cómo VENCLEXTA puede tratar la CLL/el SLL.
- Cómo tomar VENCLEXTA.
- Posibles efectos secundarios que pueden producirse.
- Recursos y asistencia que se encuentran disponibles para usted durante todo su tratamiento.
- La información proporcionada por AbbVie y Genentech tiene fines informativos solamente. No reemplaza su tratamiento ni la asesoría médica de su proveedor de atención médica.



Representación de un actor

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas 22 y 23.
Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento,
en www.rxabbvie.com/pdf/venclexta_spa.pdf.

Información para entender la leucemia linfocítica crónica (CLL) y el linfoma linfocítico de células pequeñas (SLL)

La CLL y el SLL son tipos de cáncer que afectan su sangre

Con el cáncer, las células sanas se convierten en células anómalas, no sanas, que se multiplican demasiado rápido y viven demasiado tiempo.

Normalmente, se supone que las células pasan por un proceso denominado apoptosis en el que mueren de forma natural en cierto momento. La apoptosis puede interrumpirse cuando usted tiene cáncer. Las células no sanas pueden acumularse y evitar que las células sanas hagan su trabajo.

¿Cuál es la diferencia entre la CLL y el SLL?

La CLL y el SLL son enfermedades estrechamente relacionadas. La diferencia es dónde se encuentran las células cancerosas. La leucemia comienza en la médula ósea y posteriormente se extiende a la sangre. En el SLL, las células cancerosas se encuentran principalmente en los ganglios linfáticos, que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo.

¿Cuáles son los signos y síntomas?

Por lo general, la CLL y el SLL son tipos de cáncer de crecimiento lento. Los signos y síntomas a menudo no se desarrollan durante años. Cuando se producen, pueden incluir:

- Ganglios linfáticos hinchados (a menudo en el cuello o debajo de los brazos)
- Fatiga (cansancio)
- Facilidad para sufrir hematomas

Información importante de seguridad seleccionada

- **VENCLEXTA puede provocar efectos secundarios graves, incluso síndrome de lisis tumoral (TLS).**

El TLS puede provocar insuficiencia renal, la necesidad de tratamiento con diálisis y puede ocasionar la muerte. Su proveedor de atención médica le hará pruebas para detectar el TLS. Es importante que cumpla con sus citas para los análisis de sangre. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún síntoma de TLS durante el tratamiento con VENCLEXTA, incluso fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, confusión, falta de aliento, convulsiones, latidos cardíacos irregulares, orina oscura o turbia, cansancio inusual o dolor muscular o articular. **Beba abundante agua durante el tratamiento con VENCLEXTA para ayudar a reducir el riesgo de tener TLS.**

- **No se deben tomar ciertos medicamentos cuando comienza a tomar VENCLEXTA ni mientras se aumenta lentamente la dosis, debido al riesgo de aumento del TLS. Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que reciba,** incluidos medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

¿Qué es VENCLEXTA?

VENCLEXTA está aprobado para tratar a adultos con CLL o SLL. **VENCLEXTA es una terapia dirigida que se administra por vía oral y no es quimioterapia.** Es un comprimido que ayuda a restaurar la apoptosis, y a través de la apoptosis su cuerpo reduce el número de células cancerosas.

En casos de CLL/SLL no tratados previamente, su equipo de atención médica podría recetarle VENCLEXTA junto con otro medicamento en forma de comprimido llamado acalabrutinib, un inhibidor de la tirosina-cinasa de Bruton (BTKi), o VENCLEXTA con una terapia de infusión intravenosa con GAZYVA* (obinutuzumab), un anticuerpo.

En casos de CLL/SLL tratados previamente, su equipo de atención médica puede prescribir VENCLEXTA junto con una terapia de infusión intravenosa con rituximab, un anticuerpo.

Los BTKi bloquean una proteína llamada tirosina-cinasa de Bruton, que contribuye al crecimiento y la diseminación de las células de la CLL. Las células sanas también pueden verse afectadas.

Las terapias con infusión de anticuerpos se dirigen a una proteína que se encuentra en la superficie tanto de células de la CLL como de algunas células sanguíneas sanas. Tampoco son quimioterapia y se cree que ayudan a su cuerpo a destruir las células de la leucemia. También pueden afectar las células normales.

A diferencia de otras terapias orales para la CLL, usted puede completar su tratamiento combinado en un plazo de tiempo establecido. Por lo tanto, los regímenes basados en VENCLEXTA son tratamientos de duración fija.

Qué puede significar un tratamiento de duración fija para usted



Duración fija de la exposición al fármaco

Debido a que los regímenes de VENCLEXTA se reciben durante un período de tiempo fijo, no hay ningún régimen de exposición adicional a VENCLEXTA después de completar el tratamiento.



Costo fijo

Un tratamiento de duración fija significa que puede completar la terapia, en lugar de seguirla hasta la progresión de la enfermedad. Habrá terminado de pagar VENCLEXTA + acalabrutinib después de 14 meses, VENCLEXTA + GAZYVA después de 1 año y VENCLEXTA + rituximab después de unos 2 años.*



Más tiempo sin tratamiento

El régimen de VENCLEXTA le ofrece la oportunidad de liberarse de la terapia continua para la CLL. Después de completar el régimen, puede regresar a la vida sin el recordatorio diario del tratamiento para la CLL.

Siempre tome VENCLEXTA tal y como le ha indicado su proveedor de atención médica.

*La cobertura puede variar según el plan médico. De todos modos, puede incurrir en costos de bolsillo para otros tratamientos o pruebas según las indicaciones de su proveedor de atención médica.

¿Qué hace VENCLEXTA?

VENCLEXTA está aprobado para tratar a adultos diagnosticados con CLL o SLL que no han sido tratados previamente, así como a personas que han recibido tratamiento previo (recidivante/refractario).

Seleccione una de las siguientes casillas que se apliquen a usted. El color de esa casilla le ayudará a identificar qué información de administración de dosis de esta guía es más relevante para usted.

CLL/SLL sin tratamiento previo

Páginas 16 y 17

(VENCLEXTA + acalabrutinib durante 14 meses)

Esto significa que usted y su médico decidieron que usted está preparado para empezar su primer tratamiento totalmente oral para la CLL o el SLL.

CLL/SLL sin tratamiento previo

Páginas 18 y 19

(VENCLEXTA + GAZYVA durante 12 meses)

Esto significa que usted y su médico decidieron que usted está preparado para empezar un primer tratamiento contra la CLL o el SLL que combina un medicamento oral con uno intravenoso.

CLL/SLL con tratamiento previo

Páginas 20 y 21

(VENCLEXTA + rituximab durante unos 24 meses)

Esto significa que ya ha recibido una o más terapias y que no respondió completamente al tratamiento o la enfermedad ha vuelto.

Información importante de seguridad seleccionada

VENCLEXTA puede provocar efectos secundarios graves, incluso:

- **Síndrome de lisis tumoral (TLS):** el TLS puede provocar insuficiencia renal, la necesidad de tratamiento con diálisis y puede ocasionar la muerte. Consulte la página 11 de este folleto para obtener información sobre el TLS.
- **Infecciones:** se han producido muertes e infecciones graves, como neumonía e infección sanguínea (septicemia), durante el tratamiento con VENCLEXTA. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene fiebre o algún signo de una infección durante el tratamiento con VENCLEXTA.

No se deben tomar ciertos medicamentos cuando comienza a tomar VENCLEXTA ni mientras se aumenta lentamente la dosis, debido al riesgo de aumento del TLS. Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que reciba, incluidos medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Sin tratamiento previo

La eficacia y seguridad de VENCLEXTA + acalabrutinib se estudió en un ensayo clínico

VENCLEXTA + acalabrutinib es el primer y único tratamiento totalmente oral contra la CLL diseñado para completarse en 14 meses (catorce ciclos de 28 días).

En un estudio clínico de personas que no habían recibido tratamiento contra la CLL, VENCLEXTA se estudió con un inhibidor de la BTK llamado acalabrutinib. Este régimen es totalmente oral, no es quimioterapia y se estudió en comparación con un régimen comúnmente utilizado que contiene quimioterapia. En el ensayo, 291 pacientes recibieron VENCLEXTA + acalabrutinib y 290 recibieron un régimen que incluía quimioterapia (fludarabina-ciclofosfamida-rituximab o bendamustina-rituximab).

Para obtener más información sobre este estudio, visite VENCLEXTA.com.

El tratamiento totalmente oral con VENCLEXTA + acalabrutinib para la CLL se diseñó para:



**SER COMPLETADO EN
14 MESES**



SIN QUIMIOTERAPIA

Sin tratamiento previo

La eficacia y seguridad de VENCLEXTA + GAZYVA® (obinutuzumab) se estudió en un ensayo clínico

VENCLEXTA + GAZYVA es el único tratamiento sin quimioterapia que se puede completar en 12 meses.

En un ensayo clínico de 432 personas con CLL no tratada previamente, VENCLEXTA se estudió con un tratamiento con anticuerpos llamado GAZYVA. Este régimen no es una quimioterapia y se estudió en comparación con un régimen comúnmente utilizado que contiene quimioterapia. En el ensayo, la mitad de las personas recibieron VENCLEXTA + GAZYVA y la mitad de las personas recibieron clorambucilo + GAZYVA.

Para obtener más información sobre los resultados de este estudio, visite VENCLEXTA.com.

VENCLEXTA + GAZYVA se diseñó para ser:



**SER COMPLETADO EN
12 MESES**



SIN QUIMIOTERAPIA

Si no ha recibido tratamiento previo, consulte las páginas 16-19 para obtener más información sobre el cronograma de administración de dosis.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas 22 y 23.

Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, en www.rxabbvie.com/pdf/venclexta_spa.pdf.

La eficacia y seguridad de VENCLEXTA + rituximab se estudió en un ensayo clínico

VENCLEXTA + rituximab ofrece una posibilidad de un período sin tratamiento después de unos 24 meses.

En un ensayo clínico de 389 personas con CLL tratada previamente, VENCLEXTA se estudió con un tratamiento con anticuerpos llamado rituximab. Este régimen no es una quimioterapia y se estudió en comparación con un régimen comúnmente utilizado que contiene quimioterapia. En el ensayo, 194 de las personas recibieron VENCLEXTA + rituximab y 195 de las personas recibieron bendamustina + rituximab.

Para obtener más información sobre los resultados de este estudio, visite [VENCLEXTA.com](https://www.venclexta.com).

VENCLEXTA + rituximab se diseñó para ser:



**SER COMPLETADO EN
24 MESES**



SIN QUIMIOTERAPIA

Si ha recibido un tratamiento previo para su CLL, consulte las páginas 20 y 21 para obtener más información sobre el cronograma de administración de dosis.

Información importante de seguridad seleccionada

VENCLEXTA puede provocar efectos secundarios graves, incluso síndrome de lisis tumoral (TLS). El TLS puede provocar insuficiencia renal, la necesidad de tratamiento con diálisis y puede ocasionar la muerte.

Su proveedor de atención médica le hará pruebas para detectar el TLS. Es importante que cumpla con sus citas para los análisis de sangre. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún síntoma de TLS durante el tratamiento con VENCLEXTA, incluso fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, confusión, falta de aliento, convulsiones, latidos cardíacos irregulares, orina oscura o turbia, cansancio inusual o dolor muscular o articular.

Beba abundante agua durante el tratamiento con VENCLEXTA para ayudar a reducir el riesgo de tener TLS.

Analice con su proveedor de atención médica los efectos secundarios de VENCLEXTA, algunos de los cuales pueden tratarse

VENCLEXTA puede provocar efectos secundarios graves

Síndrome de lisis tumoral (TLS): el TLS es una complicación grave. Consulte la página siguiente para obtener más información sobre los síntomas y consejos para prevenir el TLS.

Recuento bajo de glóbulos blancos: también denominado neutropenia, los recuentos bajos de glóbulos blancos son frecuentes con VENCLEXTA, pero también pueden ser graves. Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para comprobar sus recuentos sanguíneos durante el tratamiento con VENCLEXTA.

Infecciones. Se han producido muertes e infecciones graves, como neumonía e infección sanguínea (septicemia), durante el tratamiento con VENCLEXTA. Su proveedor de atención médica lo monitoreará atentamente y lo tratará de inmediato si tiene fiebre o algún signo de infección durante el tratamiento con VENCLEXTA. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene fiebre o algún signo de una infección durante el tratamiento con VENCLEXTA.

Con los regímenes de VENCLEXTA, no hay ninguna exposición adicional a VENCLEXTA después de completar el tratamiento de duración fija.

Efectos secundarios frecuentes que se produjeron con VENCLEXTA cuando se usa en combinación con GAZYVA® (obinutuzumab) o rituximab, o solo:

- Recuento bajo de glóbulos blancos
- Recuento bajo de plaquetas
- Recuento bajo de glóbulos rojos
- Diarrea
- Náuseas
- Infección de las vías respiratorias superiores
- Tos
- Dolor muscular y articular
- Cansancio
- Hinchazón de los brazos, las piernas, las manos y los pies

Los efectos secundarios más frecuentes que se observaron con VENCLEXTA cuando se utilizó en combinación con acalabrutinib:

- Recuento bajo de glóbulos blancos
- Dolor de cabeza
- Diarrea
- Dolor muscular y óseo
- COVID-19

Síntomas del TLS y consejos para su prevención

Síndrome de lisis tumoral (TLS)

El TLS es un efecto secundario grave provocado por la descomposición rápida de las células cancerosas. El TLS puede provocar insuficiencia renal, la necesidad de tratamiento con diálisis y puede ocasionar la muerte. Informe a su médico de inmediato si experimenta síntomas asociados al TLS, incluidos:

- Fiebre
- Escalofríos
- Náuseas
- Vómitos
- Confusión
- Falta de aliento
- Convulsiones
- Latidos cardíacos irregulares
- Orina oscura o turbia
- Cansancio inusual
- Dolor muscular o articular

En los ensayos clínicos, el 1 % de las personas (3 de cada 212) tratadas con VENCLEXTA + GAZYVA y el 3 % de las personas (6 de cada 194) tratadas con VENCLEXTA + rituximab tuvieron TLS. Todos los casos se resolvieron y no provocaron el retiro del estudio.

En el ensayo clínico, el 0.3 % de las personas (1 de 291) tratadas con VENCLEXTA + acalabrutinib tuvieron TLS.*

Es importante que siga las instrucciones de su proveedor de atención médica y siga los consejos para la prevención que se indican a continuación. Cuando se reinicie la administración de VENCLEXTA después de haberlo interrumpido 1 semana o más, su proveedor de atención médica puede volver a comprobar su riesgo de TLS y cambiar su dosis.

Consejos para ayudar a prevenir el TLS

El riesgo de presentar TLS puede variar entre las personas. Su proveedor de atención médica realizará análisis de sangre para determinar el riesgo de tener TLS antes de que empiece con VENCLEXTA.



Beba abundante agua

Es muy importante que tome de 6 a 8 vasos (alrededor de 56 onzas en total) de agua por día, comenzando 2 días antes de su primera dosis y en el día de su primera dosis, y cada vez que se aumente la dosis. Puede haber recibido una botella de agua de 28 onzas. Si llena esta botella de agua dos veces al día y se la bebe, cumplirá con el requisito de agua diaria.



Tome los medicamentos que le dé su médico

Su proveedor de atención médica le dará medicamentos (a veces, incluso líquidos i.v.) antes de comenzar y durante el tratamiento para ayudar a reducir el riesgo de tener TLS.



Tome VENCLEXTA como se lo indiquen

Su proveedor de atención médica puede demorar, disminuir su dosis o suspender el tratamiento con VENCLEXTA si usted tiene efectos secundarios.



Concurra a sus citas de análisis de sangre

Su proveedor de atención médica realizará análisis de sangre durante las primeras 5 semanas de tratamiento para verificar si hay TLS durante el tratamiento con VENCLEXTA. Es importante que cumpla con sus citas para los análisis de sangre.

*La información sobre el TLS proveniente del ensayo clínico no aparece en la información de prescripción.

Cómo comenzar el tratamiento con VENCLEXTA

- Lea el Calendario para el paciente de VENCLEXTA o la Guía de tratamiento para el paciente de VENCLEXTA + acalabrutinib que vienen con su paquete inicial de VENCLEXTA.
- Tome VENCLEXTA por vía oral una vez al día.
- Su equipo de atención médica empezará asignándole una dosis baja de 20 mg cada día y la aumentará gradualmente durante 5 semanas.
- El aumento escalonado de la dosis de 5 semanas está diseñado para destruir gradualmente las células cancerosas y puede ayudar a reducir el riesgo de tener TLS.
- No comience a tomar VENCLEXTA hasta que haya revisado las instrucciones específicas con su proveedor de atención médica. Es posible que se le indique que tome la primera dosis y cualquier aumento de dosis en el consultorio de su proveedor de atención médica o en el hospital.
- Después del aumento escalonado de la dosis de 5 semanas, VENCLEXTA se debe tomar a la dosis diaria recomendada de 400 mg según lo indicado hasta que su proveedor de atención médica le indique que deje de tomar VENCLEXTA o cambie su dosis.



Representación
de un actor

Información importante de seguridad seleccionada

- **VENCLEXTA puede provocar efectos secundarios graves, incluso síndrome de lisis tumoral (TLS).** El TLS puede provocar insuficiencia renal, la necesidad de tratamiento con diálisis y puede ocasionar la muerte. Su proveedor de atención médica le hará pruebas para detectar el TLS. Es importante que cumpla con sus citas para los análisis de sangre. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún síntoma de TLS durante el tratamiento con VENCLEXTA, incluso fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, confusión, falta de aliento, convulsiones, latidos cardíacos irregulares, orina oscura o turbia, cansancio inusual o dolor muscular o articular. **Beba abundante agua durante el tratamiento con VENCLEXTA para ayudar a reducir el riesgo de tener TLS.**
- **No se deben tomar ciertos medicamentos cuando comienza a tomar VENCLEXTA ni mientras se aumenta lentamente la dosis, debido al riesgo de aumento del TLS. Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que reciba,** incluidos medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Paquete inicial y frasco de comprimidos de VENCLEXTA

Utilice el calendario incluido en el kit de bienvenida para ayudarle a hacer un seguimiento del aumento escalonado de la dosis de 5 semanas.

Paquete inicial de VENCLEXTA para la CLL/el SLL



Una vez se le haya recetado VENCLEXTA, recibirá un paquete inicial con estuches semanales codificados con color de paquetes de blísteres para las semanas 1 a 4 del tratamiento.*†

Frasco de comprimidos de VENCLEXTA



El medicamento que necesitará durante el resto del tratamiento vendrá en un frasco de comprimidos como se muestra arriba.‡



Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Semana 5+

*Conserve los comprimidos de VENCLEXTA en el envase original durante las primeras 4 semanas de tratamiento. No transfiera los comprimidos a otro envase.

† Almacene VENCLEXTA a 86 °F (30 °C) o menos.

‡ Conserve VENCLEXTA en su envase original para protegerlo de la humedad.

Qué hacer y qué no hacer

¿Cómo tomo VENCLEXTA?

QUÉ HACER



Beba abundante agua todos los días cuando tome VENCLEXTA.



Tome VENCLEXTA con una comida y agua aproximadamente a la misma hora del día, todos los días. Trague los comprimidos enteros.

QUÉ NO HACER



No comience a tomar VENCLEXTA hasta que haya revisado las instrucciones con su médico.



No mastique ni parta los comprimidos.



No tome una dosis adicional si vomita después de tomar VENCLEXTA. Tome la siguiente dosis en el horario habitual al día siguiente.



No beba jugo de toronja, ni coma toronjas, naranjas de Sevilla o carambola, dado que pueden aumentar la cantidad de VENCLEXTA en la sangre.

Es importante seguir su **cronograma de administración de dosis**. El régimen de VENCLEXTA está diseñado para completarse en un plazo de tiempo establecido.

Información importante de seguridad seleccionada

Antes de tomar VENCLEXTA, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluso si usted tiene problemas hepáticos o renales; tiene problemas con las sales corporales o los electrolitos, como potasio, fósforo o calcio; tiene antecedentes de niveles de ácido úrico alto en sangre o gota; tiene programado recibir una vacuna, no debe recibir una “vacuna con virus vivos” antes, durante ni después del tratamiento con VENCLEXTA, hasta que su proveedor de atención médica se lo autorice; está embarazada o planea quedar embarazada; o está amamantando o planea amamantar. No amamante durante el tratamiento con VENCLEXTA ni hasta 1 semana después de la última dosis.

¿Qué pasa si me olvido de tomar una dosis?

Su proveedor de atención médica puede disminuir la dosis, retrasar o suspender el tratamiento si tiene efectos secundarios. **No interrumpa ni cambie su dosis, a menos que se lo indique su equipo de atención médica.**

Qué hacer si se olvida de tomar una dosis



Si omite su dosis y han pasado **MENOS DE 8 horas** desde la hora en que generalmente la toma

- Tome la dosis que omitió lo antes posible.
- Tome su siguiente dosis en el horario habitual al día siguiente.



Si omite su dosis y han pasado **MÁS de 8 horas** desde la hora en que generalmente la toma

- NO tome la dosis que omitió.
- Tome la próxima dosis en el horario habitual.

Obtenga apoyo personalizado del personal de enfermería durante el tratamiento

¿Tiene preguntas sobre su tratamiento con VENCLEXTA? Llame a nuestra línea de apoyo del personal de enfermería* para VENCLEXTA.

Puede hablar con nuestro personal de enfermería registrado sobre su tratamiento con VENCLEXTA, sin costo alguno.

Llame a nuestra línea de apoyo del personal de enfermería*: 1-844-926-6727, de lunes a viernes, de 07:00 a. m. a 07:00 p. m., hora estándar del Centro.

*El personal de enfermería de la línea de apoyo de enfermería es proporcionado por AbbVie y no trabaja bajo la dirección de un profesional de atención médica (healthcare professional, HCP) ni brinda asesoría médica. Están capacitados para dirigir a los pacientes a su proveedor de atención médica para recibir asesoría relacionada con el tratamiento, incluidas más derivaciones.

Información importante de seguridad seleccionada

Los efectos secundarios más frecuentes de VENCLEXTA cuando se usa en combinación con obinutuzumab o rituximab, o solo en personas con CLL o SLL incluyen recuento bajo de glóbulos blancos; recuento bajo de plaquetas; recuento bajo de glóbulos rojos; diarrea; náuseas; infección de las vías respiratorias superiores; tos; dolor muscular y articular; cansancio; e hinchazón de brazos, piernas, manos y pies.

VENCLEXTA puede provocar problemas de fertilidad en los hombres. Esto puede afectar su capacidad de engendrar un hijo. Informe a su proveedor de atención médica si tiene inquietudes sobre la fertilidad.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de VENCLEXTA. Para obtener más información, hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico.

Programas de apoyo financiero

Vivir con una enfermedad grave puede tener muchos desafíos y recibir su medicamento no debería ser uno de ellos. Ofrecemos varios tipos de asistencia para ayudarlo.

Asistencia de copago para los pacientes con seguro privado (por ejemplo, a través de empleadores)

Si tiene un seguro de salud comercial y cumple con otros requisitos de elegibilidad, el programa de asistencia de copago* de Genentech Oncology® puede ayudarle a pagar su medicamento. Con este programa, usted paga tan poco como un copago de \$0 por receta para VENCLEXTA + acalabrutinib, VENCLEXTA + GAZYVA o VENCLEXTA + rituximab, hasta un límite anual de \$25,000.

Visite [CopayAssistanceNow.com](https://www.CopayAssistanceNow.com) para solicitarlo o llame al **1-855-MYCOPAY (1-855-692-6729)** para consultar su elegibilidad.

Asistencia financiera para pacientes con seguro o sin seguro

Si necesita ayuda con el copago de VENCLEXTA, VENCLEXTA Access Solutions puede remitirlo a una **fundación independiente de asistencia de copago.**[†]

Puede visitar [Genentech-Access.com/VENCLEXTA/patients](https://www.Genentech-Access.com/VENCLEXTA/patients) para ver una lista de fundaciones de asistencia de copago independientes o llame al (888) 249-4918 para obtener ayuda.

La Fundación de Pacientes de Genentech[†] proporciona medicamentos de Genentech sin costo a personas que no tienen cobertura de seguro o que están preocupadas por su situación financiera y cumplen con los requisitos de elegibilidad.

Llame al 866-422-2377 para hablar con un especialista de la fundación para consultar su elegibilidad.

Para obtener información sobre asistencia financiera relacionada con el acalabrutinib, visite el sitio web de apoyo al paciente de AstraZeneca en EE. UU. en [azpatientsupport.com](https://www.azpatientsupport.com) o llame al **(800) 236-9933**.

*Este programa de copago ("Programa") es válido SOLO para pacientes con seguro comercial (privado o no gubernamental) que tienen una receta válida para una indicación aprobada de un medicamento de Genentech por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El programa no está disponible para los pacientes cuyas recetas reciben reembolso en virtud de cualquier programa de seguro federal, estatal o financiado por el gobierno (incluidos, entre otros, programas Medicare, Medicare Advantage, Medigap, Medicaid, TRICARE, del Departamento de Defensa o de Asuntos de Veteranos), o donde lo prohíba la ley o el proveedor del seguro médico del paciente. Si en algún momento un paciente comienza a recibir cobertura de medicamentos de venta con receta en virtud de cualquier programa de atención de la salud federal, estatal o financiado por el Gobierno, el paciente ya no será elegible para el programa.

En virtud del programa, es posible que se requiera que el paciente pague un copago. El monto final adeudado por un paciente puede ser de tan solo \$0 para el medicamento de Genentech (consulte detalles específicos disponibles en el sitio web del programa). El costo total de bolsillo del paciente depende del plan de seguro médico del paciente. El programa solo ayuda con el costo del medicamento de Genentech. No ayuda con el costo de otros medicamentos, procedimientos u honorarios de visitas al consultorio. Después de alcanzar el beneficio máximo del programa anual, el paciente será responsable de todos los gastos de bolsillo. El monto del beneficio del programa no puede exceder los gastos de bolsillo del paciente para el medicamento de Genentech.

Todos los participantes son responsables de notificar la recepción de todos los beneficios del programa, según sea requerido por cualquier aseguradora o ley. El programa solo es válido en los EE. UU. y los territorios de los EE. UU., es nulo cuando la ley lo prohíbe y deberá seguir las restricciones estatales en relación con los equivalentes genéricos calificados por AB (p. ej., MA, CA) cuando corresponda. Ninguna de las partes puede solicitar el reembolso de la totalidad o parte del beneficio recibido a través del programa. El valor del programa está destinado exclusivamente al beneficio del paciente. Los fondos disponibles a través del programa solo pueden utilizarse para reducir los costos de bolsillo para el paciente inscrito en el programa. El programa no está destinado al beneficio de terceros, incluidos, entre otros, terceros pagadores, gerentes de beneficios de farmacia o sus agentes. Si Genentech determina que un tercero ha implementado un programa que ajusta las obligaciones de participación en los costos del paciente en función de la disponibilidad de apoyo en virtud del programa y/o excluye la asistencia proporcionada en virtud del programa de modo que no se tome en cuenta para el deducible del paciente o las limitaciones en los costos de bolsillo, Genentech puede imponer un tope por reposición en la asistencia de participación en los costos disponible en virtud del programa. La presentación de información verdadera y precisa es un requisito para la elegibilidad y Genentech se reserva el derecho de descalificar a los pacientes que no cumplan con los términos y condiciones del programa de Genentech. Genentech se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar el programa sin previo aviso en cualquier momento.

Se aplican términos y condiciones adicionales. Visite el sitio web del programa de copagos para obtener la lista completa de los Términos y condiciones.

VENCLEXTA + acalabrutinib es el primer y único tratamiento totalmente oral de duración fija para la CLL

Antes de empezar a tomar VENCLEXTA, comenzará tomando comprimidos de acalabrutinib

- 1 Durante el **mes 1**, tomará acalabrutinib dos veces al día (con un intervalo de aproximadamente 12 horas).
- 2 En el **mes 3**, añadirá VENCLEXTA.
- 3 Empezará con una dosis baja de VENCLEXTA y la irá aumentando gradualmente hasta alcanzar una dosis más alta; esto se conoce como período de **"aumento escalonado"**.
- 4 Después del período de aumento escalonado de 5 semanas, **continuará con VENCLEXTA una vez al día** junto con acalabrutinib **dos veces al día** hasta el final de los 14 meses de tratamiento.

Información importante de seguridad seleccionada

Los efectos secundarios más frecuentes de VENCLEXTA cuando se usa en combinación con obinutuzumab o rituximab, o solo en personas con CLL o SLL incluyen recuento bajo de glóbulos blancos; recuento bajo de plaquetas; recuento bajo de glóbulos rojos; diarrea; náuseas; infección de las vías respiratorias superiores; tos; dolor muscular y articular; cansancio; e hinchazón de brazos, piernas, manos y pies.

VENCLEXTA puede provocar problemas de fertilidad en los hombres. Esto puede afectar su capacidad de engendrar un hijo. Informe a su proveedor de atención médica si tiene inquietudes sobre la fertilidad.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de VENCLEXTA. Para obtener más información, hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico.

El tratamiento está diseñado para completarse en 14 meses (catorce ciclos de 28 días)

Es posible que su proveedor de atención médica le indique que tome VENCLEXTA de una forma diferente a la descrita aquí. Tome VENCLEXTA exactamente como le haya indicado su proveedor de atención médica. Consulte la página 10 para obtener información importante sobre el inicio del tratamiento con VENCLEXTA.

INICIAR EL TRATAMIENTO

SEMANAS 1-8

Fase inicial: solo acalabrutinib

Empezar y seguir con acalabrutinib:

Tome un comprimido de 100 mg, por vía oral, dos veces al día (con un intervalo de unas 12 horas) **hasta la semana 56.**

100 mg por la mañana + 100 mg por la tarde

SEMANAS 9-56 (hasta 14 meses)

Fase de tratamiento combinado: agregar VENCLEXTA al acalabrutinib

Semanas 9 a 12
Inicio VENCLEXTA:
Aumento escalonado

SEMANA 9



56 oz 10 mg × 2

Tome 2 comprimidos de VENCLEXTA de 10 mg, TODOS LOS DÍAS, durante 7 días
(Total: 20 mg)

SEMANA 10



56 oz 50 mg × 1

Tome 1 comprimido de VENCLEXTA de 50 mg, TODOS LOS DÍAS, durante 7 días
(Total: 50 mg)

SEMANA 11



56 oz 100 mg × 1*

Tome 1 comprimido de VENCLEXTA de 100 mg, TODOS LOS DÍAS, durante 7 días
(Total: 100 mg)

SEMANA 12



56 oz 100 mg × 2*

Tome 2 comprimidos de VENCLEXTA de 100 mg, TODOS LOS DÍAS, durante 7 días
(Total: 200 mg)

Semanas 13 a 56
Continúe con VENCLEXTA

SEMANA 13-56



56 oz 100 mg × 4*

Tome 4 comprimidos de VENCLEXTA de 100 mg, TODOS LOS DÍAS, durante 7 días y CONTINÚE hasta la semana 56
(Total: 400 mg)

TRATAMIENTO COMPLETO

¿Cómo debo conservar mis medicamentos?

- VENCLEXTA: Almacenar a 86 °F (30 °C) o menos. Para protegerlos de la humedad, mantenga los comprimidos en su envase original. No transfiera los comprimidos a otro envase.
- Acalabrutinib: Almacene acalabrutinib a una temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (entre 20 °C y 25 °C).

Los comprimidos que se muestran no son de tamaño real.

*Informe a su proveedor de atención médica si tiene problemas para tragar los comprimidos de VENCLEXTA. Su proveedor de atención médica puede recetarle la dosis en comprimidos más pequeños.

VENCLEXTA es un comprimido que toma por vía oral una vez al día

Antes de empezar a tomar VENCLEXTA, recibirá infusiones de  GAZYVA® (obinutuzumab).

1

En el **mes 1**, recibirá  GAZYVA el **primer día de las semanas 1 a 3**; sin embargo, su primera dosis de GAZYVA se **dividirá entre los días 1 y 2**.

2

Empezará a tomar VENCLEXTA **después de las primeras 3 semanas** del tratamiento con  GAZYVA.

3

Empezará con una dosis baja de VENCLEXTA y se subirá gradualmente hasta una dosis más alta; esto se conoce como el período de “**aumento escalonado**”.

4

Recibirá  GAZYVA **una vez al mes, el primer día de los meses 2 a 6**.

5

Usted **continuará** tomando VENCLEXTA **una vez al día** hasta el final del período de tratamiento de **12 meses**.

Información importante de seguridad seleccionada

VENCLEXTA puede provocar efectos secundarios graves, incluso síndrome de lisis tumoral (TLS). El TLS puede provocar insuficiencia renal, la necesidad de tratamiento con diálisis y puede ocasionar la muerte. Su proveedor de atención médica le hará pruebas para detectar el TLS. Es importante que cumpla con sus citas para los análisis de sangre. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún síntoma de TLS durante el tratamiento con VENCLEXTA, incluso fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, confusión, falta de aliento, convulsiones, latidos cardíacos irregulares, orina oscura o turbia, cansancio inusual o dolor muscular o articular. **Beba abundante agua durante el tratamiento con VENCLEXTA para ayudar a reducir el riesgo de tener TLS.**

El tratamiento está diseñado para que se complete en 12 meses

Es posible que su proveedor de atención médica le indique que tome VENCLEXTA de una forma diferente a la descrita aquí.

Tome VENCLEXTA exactamente como le haya indicado su proveedor de atención médica.

Consulte la página 10 para obtener información importante sobre el inicio del tratamiento con VENCLEXTA.

 = día de infusión con GAZYVA

		Mes 1							con GA		
Período de aumento escalonado de VENCLEXTA	Semana 1		1		2	3	4	5	6	7	
			8		9	10	11	12	13	14	
			15		16	17	18	19	20	21	
			22		23	24	25	26	27	28	
	VENCLEXTA 20 mg una vez al día										
	Mes 2										
	Semana 2		1	2	3	4	5	6	7		
		VENCLEXTA 50 mg una vez al día									
	Semana 3		8	9	10	11	12	13	14		
		VENCLEXTA 100 mg una vez al día									
Semana 4		15	16	17	18	19	20	21			
	VENCLEXTA 200 mg una vez al día										
Semana 5		22	23	24	25	26	27	28			
	VENCLEXTA 400 mg una vez al día										
Meses 3 a 6											
Semana 1		1	2	3	4	5	6	7			
	VENCLEXTA 400 mg una vez al día										
Semanas 2 a 4		8	9	10	11	12	13	14			
	VENCLEXTA 400 mg una vez al día										
Meses 7 a 12											
Semanas 1 a 4		1	2	3	4	5	6	7			
	VENCLEXTA 400 mg una vez al día										

Sin tratamiento previo: oral + infusión

VENCLEXTA es un comprimido que toma por vía oral una vez al día

1

Empezará con una dosis baja de VENCLEXTA y se subirá gradualmente hasta una dosis más alta; esto se conoce como el período de **"aumento escalonado"**.

2

Después del **período de aumento escalonado de VENCLEXTA de 5 semanas**, empezará a recibir  rituximab el primer día de cada mes durante **6 meses**.

3

Continúe tomando VENCLEXTA a **400 mg una vez al día, o según lo indicado, durante 24 meses** después del período de aumento escalonado.

Información importante de seguridad seleccionada

VENCLEXTA puede provocar efectos secundarios graves, incluso síndrome de lisis tumoral (TLS).



El TLS puede provocar insuficiencia renal, la necesidad de tratamiento con diálisis y puede ocasionar la muerte. Su proveedor de atención médica le hará pruebas para detectar el TLS. Es importante que cumpla con sus citas para los análisis de sangre. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún síntoma de TLS durante el tratamiento con VENCLEXTA, incluso fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, confusión, falta de aliento, convulsiones, latidos cardíacos irregulares, orina oscura o turbia, cansancio inusual o dolor muscular o articular. **Beba abundante agua durante el tratamiento con VENCLEXTA para ayudar a reducir el riesgo de tener TLS.**

El tratamiento está diseñado para que se complete en alrededor de 24 meses

Es posible que su proveedor de atención médica le indique que tome VENCLEXTA de una forma diferente a la descrita aquí.

Tome VENCLEXTA exactamente como le haya indicado su proveedor de atención médica.

Consulte la página 10 para obtener información importante sobre el inicio del tratamiento con VENCLEXTA.



Si su médico le receta VENCLEXTA solo:

- 1 Empezará con una dosis baja de VENCLEXTA y se subirá gradualmente hasta una dosis más alta; esto se conoce como el período de “aumento escalonado”.
- 2 Seguirá tomando VENCLEXTA a la dosis diaria completa recomendada de 400 mg hasta que su proveedor de atención médica le indique que deje de tomarlo o cambie su dosis.

Uso e Información importante de seguridad

¿Qué es VENCLEXTA® (comprimidos de venetoclax)?

VENCLEXTA es un medicamento de venta con receta para tratar a adultos con leucemia linfocítica crónica (CLL) o linfoma linfocítico de células pequeñas (SLL). Se desconoce si VENCLEXTA es seguro y eficaz en niños.

Información importante de seguridad

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de VENCLEXTA?

VENCLEXTA puede provocar efectos secundarios graves, incluso:

Síndrome de lisis tumoral (TLS). El TLS se debe a la descomposición rápida de las células cancerosas. El TLS puede provocar insuficiencia renal, la necesidad de tratamiento con diálisis y puede ocasionar la muerte. Su proveedor de atención médica realizará análisis para controlar el riesgo de tener TLS antes de que comience a tomar VENCLEXTA. Recibirá otros medicamentos antes de comenzar el tratamiento con VENCLEXTA y durante este para ayudarlo a reducir el riesgo de TLS. Es posible que también reciba líquidos intravenosos (i.v.) en la vena. Su proveedor de atención médica realizará análisis de sangre para detectar si hay TLS cuando inicie por primera vez y durante el tratamiento con VENCLEXTA. Es importante que cumpla con sus citas para los análisis de sangre. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún síntoma de TLS durante el tratamiento con VENCLEXTA, incluso fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, confusión, falta de aliento, convulsiones, latidos cardíacos irregulares, orina oscura o turbia, cansancio inusual o dolor muscular o articular.

Beba abundante agua durante el tratamiento con VENCLEXTA para ayudar a reducir el riesgo de tener TLS. Tome de 6 a 8 vasos (alrededor de 56 onzas en total) de agua por día, comenzando 2 días antes de su primera dosis y en el día de su primera dosis de VENCLEXTA, y cada vez que se aumente la dosis.

Su proveedor de atención médica puede demorar, disminuir su dosis o suspender el tratamiento con VENCLEXTA si usted tiene síntomas de TLS. Cuando se reinicie la administración de VENCLEXTA después de haberlo interrumpido 1 semana o más, su proveedor de atención médica puede volver a comprobar su riesgo de TLS y cambiar su dosis.

¿Quién no debe tomar VENCLEXTA?

Los pacientes que toman ciertos medicamentos durante el inicio de VENCLEXTA (cuando la dosis se aumenta lentamente) tienen un mayor riesgo de TLS.

- **Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que reciba**, incluidos medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. VENCLEXTA y otros medicamentos pueden interactuar entre sí y causar efectos secundarios graves.

- No empiece a tomar medicamentos nuevos durante el tratamiento con VENCLEXTA sin hablar primero con su proveedor de atención médica.

Antes de tomar VENCLEXTA, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- Tiene problemas hepáticos o renales.
- Tiene problemas con las sales corporales o los electrolitos, como potasio, fósforo o calcio.
- Tiene antecedentes de niveles de ácido úrico alto en sangre o gota.
- Tiene programado recibir una vacuna. No debe recibir una "vacuna con virus vivos" antes, durante ni después del tratamiento con VENCLEXTA, hasta que su proveedor de atención médica se lo autorice. Si no está seguro sobre el tipo de inmunización o vacuna, pregunte a su proveedor de atención médica. Es posible que estas vacunas no sean seguras o no funcionen tan bien durante el tratamiento con VENCLEXTA.
- Si está embarazada o planea quedar embarazada. Es posible que VENCLEXTA cause daño a su bebé por nacer.

Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- Su proveedor de atención médica debe realizarle una prueba para la detección del embarazo antes de iniciar el tratamiento con VENCLEXTA.
- Debe usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y por 30 días después de la última dosis de VENCLEXTA.
- Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o piensa que está embarazada.
- está amamantando o planea amamantar. No se sabe si VENCLEXTA pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con VENCLEXTA ni hasta 1 semana después de la última dosis.

¿Qué debo evitar mientras tomo VENCLEXTA?

No debe beber jugo de toronja, ni comer toronjas, naranjas de Sevilla (generalmente en mermeladas), ni carambola durante el tratamiento con VENCLEXTA. Estos productos pueden aumentar la cantidad de VENCLEXTA en la sangre.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VENCLEXTA?

VENCLEXTA puede provocar efectos secundarios graves, incluso:

- **Recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia).**
Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para comprobar sus recuentos sanguíneos durante el tratamiento con VENCLEXTA y puede pausar la administración de la dosis de VENCLEXTA o administrarle medicamentos para ayudarle a tratar la neutropenia si es grave.
- **Infecciones.** Se han producido muertes e infecciones graves, como neumonía e infección sanguínea (septicemia), durante el tratamiento con VENCLEXTA. Su proveedor de atención médica lo monitoreará atentamente y lo tratará de inmediato si tiene fiebre o algún signo de infección durante el tratamiento con VENCLEXTA.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene fiebre o algún signo de una infección durante el tratamiento con VENCLEXTA.

Los efectos secundarios más frecuentes de VENCLEXTA cuando se combina con acalabrutinib en personas con CLL o SLL incluyen un recuento bajo de glóbulos blancos, cefalea, diarrea, dolor muscular y óseo, y COVID-19.

Los efectos secundarios más frecuentes de VENCLEXTA cuando se usa en combinación con obinutuzumab o rituximab, o solo en personas con CLL o SLL incluyen recuento bajo de glóbulos blancos; recuento bajo de plaquetas; recuento bajo de glóbulos rojos; diarrea; náuseas; infección de las vías respiratorias superiores; tos; dolor muscular y articular; cansancio; e hinchazón de brazos, piernas, manos y pies.

Es posible que su proveedor de atención médica deba interrumpir temporalmente el tratamiento con VENCLEXTA, reducir la dosis o interrumpir completamente el tratamiento si tiene efectos secundarios graves.

VENCLEXTA puede provocar problemas de fertilidad en los hombres. Esto puede afectar su capacidad de engendrar un hijo. Informe a su proveedor de atención médica si tiene inquietudes sobre la fertilidad.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de VENCLEXTA. Llame a su médico para recibir asesoría médica acerca de los efectos secundarios.

Se le recomienda informar los efectos secundarios de los fármacos de venta con receta a la FDA.

Visite www.fda.gov/medwatch o llame al teléfono 1-800-FDA-1088.

Si no puede pagar sus medicamentos, comuníquese con genentech-access.com/patient/brands/venclerxa para obtener ayuda.



El tratamiento está diseñado para completarse



Siga la lista de comprobación que se encuentra a continuación para el inicio de su tratamiento



Confirme cómo comenzará el tratamiento

Hable con su proveedor de atención médica para saber cuándo y dónde comenzará su tratamiento. Recuerde tomar VENCLEXTA exactamente como le indicó el equipo de atención médica. Utilice el calendario guardado en la solapa de esta página para ayudar a hacer un seguimiento de sus dosis diarias.



Confirme el método de entrega

Hable con su proveedor de atención médica para determinar cómo obtener su medicamento.



Llame a nuestra línea de apoyo del personal de enfermería* si tiene alguna pregunta

- ¿Tiene preguntas sobre su tratamiento con VENCLEXTA? Llame a nuestra línea de apoyo del personal de enfermería* para VENCLEXTA. Puede hablar con nuestro personal de enfermería registrado sobre su tratamiento con VENCLEXTA, sin costo alguno.
- Llame al 1-844-926-6727, de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., hora estándar del Centro.

Obtenga información adicional sobre vivir con leucemia†

Blood Cancer United

www.bloodcancerunited.org
1-800-955-4572

Lymphoma Research Foundation

www.lymphoma.org
1-800-500-9976

American Cancer Society

www.cancer.org
1-800-227-2345

VENCLEXTA es un medicamento de venta con receta para tratar a adultos con leucemia linfocítica crónica (CLL) o linfoma linfocítico de células pequeñas (SLL).

Se desconoce si VENCLEXTA es seguro y eficaz en niños.

Información importante de seguridad seleccionada

VENCLEXTA puede provocar efectos secundarios graves, incluso síndrome de lisis tumoral. Se han producido muertes e infecciones graves, como neumonía e infección sanguínea (septicemia), durante el tratamiento con VENCLEXTA. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene fiebre o algún signo de una infección durante el tratamiento con VENCLEXTA.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas 22 y 23.

Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, en www.rxabbvie.com/pdf/venclexta_spa.pdf.

*El personal de enfermería de la línea de apoyo de enfermería es proporcionado por AbbVie y no trabaja bajo la dirección de un profesional de atención médica (healthcare professional, HCP) ni brinda asesoría médica. Están capacitados para dirigir a los pacientes a su proveedor de atención médica para recibir asesoría relacionada con el tratamiento, incluidas más derivaciones.

†La información proporcionada por AbbVie y Genentech tiene fines informativos solamente. No reemplaza el tratamiento ni el asesoría médica de su proveedor de atención médica. Las organizaciones enumeradas anteriormente no respaldan a AbbVie ni a Genentech, ni a ninguno de sus respectivos productos o servicios. AbbVie y Genentech han enumerado estas organizaciones solo por cuestiones de conveniencia y de acuerdo con los permisos otorgados en virtud de sus respectivos términos de uso. Cada organización tiene sus propios términos y condiciones, y su política de privacidad, los cuales debe leer si elige comunicarse con alguna de ellas.

© 2026 AbbVie y Genentech, Inc. Todos los derechos reservados.
VENCLEXTA® y su diseño son marcas comerciales registradas de AbbVie Inc.
GAZYVA® y sus diseños son marcas comerciales registradas de Genentech, Inc.

US-VENC-260224 Agosto de 2026